

AMARANTHUS RETROFLEXUS

Nom commun : **Amaranthe réfléchie**
Catégorie : **FLORE**
Famille : ***Amaranthaceae***
Milieu : **Alluvions des cours d'eau**
Origine géographique : **régions tropicales et subtropicales d'Amérique**
Nom Anglais : **Common Amaranth, redroot pigweed**
Auteur : **Linné, 1753**
Introduction en France : **Métropole et outre-mer**

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Les amaranthes ont été introduites en Europe au XVIème siècle comme plantes d'ornement. Les premières observations mentionnées en France d'*Amaranthus retroflexus* datent de 1785, dans le département de la Loire (SIFlore).
Les amaranthes colonisent les cultures estivales et font partie des adventices les plus fréquentes dans les cultures de maïs, les cultures maraîchères, les vignes, les friches, les alluvions récentes des rivières (Fried, 2012). Aucun impact sur la biodiversité n’a été documenté.

Répartitions :
En France
En Europe
Contributions :
Date de rédaction : **25/04/2016, version 1**

PRODUCT DESCRIPTION

Pas d’expérience de gestion connue actuellement.Tela botanicaINPN
DAISIE
CABI
EPPO
GB NNSSFried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.
Espèce inscrite sur la liste des organismes nuisibles dont l’introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1

CITATION

GT IBMA. 2016. *Amaranthus retroflexus*. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.