



AMMANIA COCCINEA

Nom commun : Ammania écarlate

Catégorie : FLORE

Famille : *Lythraceae*

Milieu : Rizières de Camargue

Origine géographique : Amérique du Nord

Nom Anglais : Valley redstem

Auteur : Rottball, 1773

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Ammannia coccinea est une espèce inféodée aux rizicultures en Camargue. Elle est mentionnée pour la première fois au début du XVIème siècle (SIFlore), en Camargue. Elle n'est actuellement observée que dans le département des Bouches-du-Rhône et du Gard.

Aucun impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 25/04/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanicaInvMed](#)

[INPN](#)

[EPPO](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

Espèce inscrite sur la [Liste des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1](#)

CITATION

GT IBMA. 2016. *Ammannia coccinea*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

