AMMANIA COCCINEA

Nom commun : **Ammania écarlate**
Catégorie : **FLORE**
Famille : ***Lythraceae***
Milieu : **Rizières de Camargue**
Origine géographique : **Amérique du Nord**
Nom Anglais : **Valley redstem**
Auteur : **Rottball, 1773**
Introduction en France : **Métropole**

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Ammannia coccinea est une espèce inféodée aux rizicultures en Camargue. Elle est mentionnée pour la première fois au début du XVIème siècle (SIFlore), en Camargue. Elle n'est actuellement observée que dans le département des Bouches-du-Rhône et du Gard.
Aucun impact documenté actuellement.

Répartitions :
En France
En Europe

Contributions :
Date de rédaction : **25/04/2016, version 1**

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.Tela botanicaInvMed
INPN
EPPO
Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.

Espèce inscrite sur la Liste des organismes nuisibles dont l’introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1

CITATION

GT IBMA. 2016. *Ammannia coccinea*. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.