Pas de photographie disponible actuellement

CASPIOBDELLA FADAJEWI

Nom commun : ***Caspiobdella fadajewi***
Catégorie : **FAUNE**
Famille : ***Piscicolidae***
Milieu : **Eau douce**
Origine géographique : **rivières qui rejoignent la mer Noire**
Nom Anglais :
Auteur : **Epshtein, 1961**
Introduction en France : **métropole**

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

D'origine Ponto-caspienne, l'espèce a colonisé deux affluents de la Vistule, en Pologne (Geissen & Schöll 1998 in Invabio, 2013), les rivières San et Biebrza, ainsi qu'un tronçon du Rhin. Dans la rivière Biebrza, l'espèce a été repérée en 1989, fixée sur la tête et les opercules de poissons. En 1998 dans le Rhin aval, des individus ont été trouvés sur des substrats durs (Geissen & Schöll 1998 in Invabio, 2013), et en 2000 dans des échantillons benthiques d'un espace restauré le long de la rivière Waal, affluent principal du delta du Rhin. *Caspiobdella fadejewi* est l'espèce dominante de *Piscicolidae* dans le secteur autrichien du Danube. Elle a récemment été observée plus à l'amont dans le secteur allemand du Danube (Geissen & Schöll 1998, in Invabio, 2013). En France, l'espèce est présente dans le Rhin (Invabio, 2013).
Considérée comme un parasite, c'est à l'occasion du contrôle sanitaire de poissons que cette espèce pourrait être repérée. En Russie, chez l'esturgeon, il a été montré que la présence d'*Hirudinae* sur un hôte favorise une infection par des protozoaires (Bauer *et al.*, 2002, in Invabio, 2013).

Répartitions :
En France
En Europe
Contributions :
Date de rédaction : **04/07/2016, version 2**

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.Invabio
INPN
DAISIE
Invabio

Bauer, O.N., Pugachev, O.N., Voronin, V.N., 2002. Study of parasites and diseases of sturgeons in Russia: a review. Journal of Applied Ichthyology 18, 420–429. doi:10.1046/j.1439-0426.2002.00422.x
Geissen H.-P., and Schöll F. 1998. Erste Nachweise des Fischegels Caspiobdella fadejewi (Epshtein 1961) (Hirudinea: Piscicolidae) im Rhein. *Lauterbornia*, 33: 11–12.

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Caspiobdella fadajewi*. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.