



CLAYTONIA PERFOLIATA

Nom commun : Claytonie perfoliée, Claytone de Cuba, Pourpier d'hiver

Catégorie : FLORE

Famille : *Portulacaceae*

Milieu : Berges des cours d'eau, milieux frais et humides, tourbières

Origine géographique : Ouest de l'Amérique du Nord

Nom Anglais : Spring beauty

Auteur : Donn ex Willd., 1798

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

La Claytonie perfoliée a été introduite en Europe pour la consommation en tant que légume feuille. Elle est cultivée dans certaines exploitations de maraîchage. Échappée des jardins, elle est principalement présente sur les côtes bretonnes. Elle a colonisé les fourrés et bois littoraux où elle abonde réellement par endroit, notamment dans le Golfe du Morbihan. Annuelle, elle se dissémine par ses graines. Elle ne fait l'objet à l'heure actuelle d'aucune mesure de gestion ni de surveillance. Elle s'intègre à la flore rudérale de sous-bois en Bretagne ([Peloté et al., 2008](#)).

Pas d'impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest

Date de rédaction : 24/07/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[INRA](#)

[Observatoire de la biodiversité en Bretagne](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[GB NNS](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Claytonia perfoliata*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

