



CYPERUS ERAGROSTIS

Noms communs : Souchet vigoureux, Souchet robuste

Catégorie : FLORE

Famille : *Cyperaceae*

Milieu : Berges et grèves humides des bords de cours d'eau sur sable, gravier ou vase, fossés et friches humides

Origine géographique : Amérique du Sud

Nom Anglais : Tall flatsedge, Pale Galingale

Auteur : Lamarck, 1791

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue en France actuellement. L'arrachage manuel et la fauche avant floraison peuvent être pratiqués.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

La première observation documentée de Souchet vigoureux en France date de 1871, dans le département des Alpes-maritimes (SIFlore). Il s'est progressivement implanté dans tout le Sud-Ouest, puis en Auvergne (1970), en Bourgogne (1980) et il semble continuer sa progression (Fried, 2012).

Le Souchet robuste est en extension mais ne forme pas de population denses et ne semble pas avoir d'impacts sur la flore indigène (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

Contributions : Christophe Pineau (CEREMA Ouest)

Date de rédaction : 27/04/2016, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.

[Invabio](#)

[Tela botanica](#)

[CIRAD - Plantes des rizières de Camargue](#)

[INPN](#)

[CABI](#)

[EPPO](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Cyperus eragrostis*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

