

Pas de photographie
disponible actuellement

ECHINOGAMMARUS BERILLONI

Nom commun : *Echinogammarus berilloni*

Catégorie : FAUNE

Famille : *Gammaridae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Péninsule
ibérique

Nom Anglais : *Echinogammarus berilloni*

Auteur : Catta, 1878

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce s'est répandue dans toute la France à partir du Nord de l'Espagne (elle serait également native du Sud-Ouest de la France), elle domine aujourd'hui les communautés dans beaucoup de cours d'eau ([Pacaud, 1945](#) ; [Chovet et Lécureuil, 1994](#)).

Une compétition est possible avec d'autres espèces d'amphipodes ([Pacaud, 1945](#)), d'autres impacts ne sont pas documentés.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 05/05/2017, version 1.

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement

[ONEMA Nord-Est \(p. 109-110\)](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[WORMS](#)

[Chovet, M. 1994. Répartition des Gammaridae épigés \(Crustacés, Amphipodes\) dans la Loire et les rivières de la région Centre \(France\). Anns Limnol. 30\(1\): 11-23.](#)

[Pacaud, A. 1945. Les amphipodes de la faune nutritive des eaux douces françaises. Bulletin français de pisciculture 138: 105-120.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Echinogammarus berilloni*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

