



GALEGA OFFICINALIS

Noms communs : Sainfoin d'Espagne, Lilas d'Espagne, Rue des chèvres

Catégorie : FLORE

Famille : *Fabaceae*

Milieu : Berges de cours d'eau, bords des routes, friches, prairies, fossés et talus

Origine géographique : Europe méridionale, centrale et orientale, Sud-Ouest de l'Asie

Nom anglais : Goat's rue

Auteur : Linné, 1753

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Plusieurs modalités de gestion ont été testées dans l'Est de la France, où l'espèce pose des problèmes de colonisation de prairies et des risques de toxicité pour le bétail. L'EPTB Seine Grands Lacs a mené plusieurs expérimentations dans une prairie en lisière de boisement : arrachage et application de sel, bâchage, arrachage manuel, application de produits phytosanitaires, broyage et tonte. La technique la plus efficace semble l'arrachage manuel de l'intégralité de la plante (racines et parties aériennes). Cette technique s'applique pour les populations de petite taille, et la germination des graines est à surveiller les années suivant les interventions ([Amon-Moreau, 2017](#)).

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

En France, la partie aérienne fleurie est utilisée dans la médecine traditionnelle européenne et d'outre-mer, notamment pour son action hypoglycémiante et galactogène (favorisant la sécrétion lactée). La plante figure dans la [liste A des Plantes Médicinales de la Pharmacopée française \(janvier 2020\)](#). Une grande incertitude sur le risque toxicologique lié à l'utilisation de l'extrait de *Galega officinalis* chez la femme allaitante et indirectement chez le nouveau-né, conduit à une réserve majeure de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) sur la sécurité d'emploi de préparation à base de cette plante ([Afssa, 2010](#)).

Le Sainfoin d'Espagne a également été introduit pour la production fourragère et comme plante ornementale (Fried, 2012). Son développement dans les prairies pâturées pose problème car la plante est très toxique pour le bétail : ses racines le sont à tout moment de l'année et les parties aériennes le deviennent à partir de la floraison ([Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantique, 2017](#)).

Les impacts sur la végétation indigène sont à préciser (Fried, 2012). Un appauvrissement de la richesse spécifique conduisant à la banalisation de la flore prairiale et de l'entomofaune associée est néanmoins observé par les gestionnaires de ces milieux ([Amon-Moreau, 2017](#)).

Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

Contributions :

Date de rédaction : 01/07/2020, version 2.

PRODUCT DESCRIPTION

Gestion du Sainfoin d'Espagne par l'EPTB Seine Grands Lacs (Grand-Est) - en cours de rédaction

[EEE Grand Est](#)

[Tela Botanica](#)

[CBN du Bassin Parisien](#)

[Site vegetox de l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse](#)

[Néophytes envahissantes](#)

[INPN](#)

[CABI](#)

[EPPO](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

[Amon-Moreau. 2017. Gestion du Sainfoin d'Espagne par l'EPTB Seine Grands Lacs. Séminaire sur les espèces exotiques envahissantes, Parc naturel régional de la Montagne de Reims, 27 avril 2017. 31 pp.](#)

[Agence française de sécurité sanitaire des aliments. 2010. Avis du 7 juin 2010 relatif à la sécurité d'emploi d'une plante \(*Galega officinalis*\) dans les compléments alimentaires. Afssa - Saisine n° 2010-SA-0022.](#)

[Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantique. 2017. GALEGA OFFICINAL :ATTENTION PLANTE TOXIQUE ! Octobre 2017](#) Espèce non réglementée.

CITATION

OFB & UICN France. 2020. *Galega officinalis*. Base d'information sur les espèces exotiques envahissantes. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. UICN France et Office français de la biodiversité.

