



GALINSOGA QUADRIRADIATA

Noms communs : Galinsoga cilié, Galinsoga velu

Catégorie : FLORE

Famille : Asteraceae

Milieu : Berges, grèves de cours d'eau

Origine géographique : Amérique du Sud

Nom Anglais : Shaggy soldier

Auteur : Ruiz & Pavon, 1798

Introduction en France : métropole

MODALITES DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement dans les milieux naturels. En maraîchage biologique, outre les mesures de prévention et d'arrachage précoce de la plante, des méthodes de sarclage mécanique ou manuel et de travail du sol sont préconisées ([FREDON Nord Pas de Calais, 2009](#)).

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'espèce a été introduite pour l'ornement en France plus tardivement que *Galinsoga parviflora*, en 1910. C'est désormais la plus fréquente des deux espèces. Elle peut devenir très envahissante dans les cultures maraîchères mais n'a pas d'impacts documentés sur les milieux naturels (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau, Cerema Ouest

Date de rédaction : 15/11/2017, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion connu actuellement. [Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[FREDON Nord Pas de Calais. 2009. Lutter contre le galinsoga en maraîchage biologique. 4 pp.](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Galinsoga quadriradiata*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

