

HETERANTHERA RENIFORMIS

Nom Commun : **Hétéranthère reniforme**
Catégorie : **FLORE**
Famille : ***Pontederiaceae***
Milieu : **Marais, rives de plans d'eau, rizières**
Origine géographique : **Amérique**
Nom Anglais : **Mud plantain**
Auteur : **Ruiz & Pavon**
Introduction en France : **métropole**

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTES

Introduit en 1989 en Camargue, *Heteranthera reniformis* s'est depuis propagé rapidement. On ne le trouve que dans 5 % des rizières, mais cette fréquence augmente et il est abondant là où il se trouve. On le rencontre en bordure, mais aussi à l'intérieur des parcelles, notamment dans les traces de roues et dans les entrées d'eau (CIRAD, 2007). Comme *Heteranthera limosa* , *Heteranthera reniformis* montre une forte capacité d'infestation des parcelles de riz. *Heteranthera reniformis* semble plus apte à envahir les rizières qu' *Heteranthera limosa*, du fait de sa taille et de son port étalé. Ses graines, qui peuvent conserver leur pouvoir germinatif pendant plusieurs années, se propagent facilement par les voies de circulation d'eau (CIRAD, 2007).

Répartitions :
En France
En Europe
Contributions :
Date de rédaction : 10/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d’expérience de gestion connu actuellement.ARPE
CIRAD
INRA
Tela Botanica
INPN
DAISIE

Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Heteranthera reniformis*. Base d’information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.