



IPOMOEA PURPUREA

Noms commun : Liseron, Ipomée pourpre, Volubilis

Catégorie : FLORE

Famille : *Convolvulaceae*

Milieu : Ripisylve

Origine géographique : Amérique tropicale

Nom Anglais : Tall morning glory

Auteur : (Linné) Roth, 1787

Introduction en France : métropole et outre-mer

MODALITÉS DE GESTION

Sur les petites surfaces colonisées par *Ipomoea purpurea*, il est possible d'arracher facilement les plantules à la main. Les tiges peuvent être coupées à la base de la plante pour que la partie aérienne meure, et les racines doivent être arrachées manuellement (CABI, 2015).

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'Ipomée des Indes et l'Ipomée pourpre ont été introduites et cultivées comme plantes ornementales dans la région méditerranéenne pour recouvrir les murs ou les pergolas (Fried, 2012).

Elles ont une croissance rapide et forment des peuplements étendus grimpant dans les arbres ou recouvrant densément le sol, pouvant ainsi éliminer localement certaines espèces par compétition (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Marianne Hédont et Maxime Guérin, Plante et Cité

Date de rédaction : 13/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas d'expérience de gestion connue actuellement. [Tela Botanica](#)

[CIRAD](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce inscrite sur la [Liste des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1](#)

CITATION

GT IBMA. 2016. *Ipomoea purpurea*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

