



LITHOBATES CATESBEIANUS

Noms commun : Grenouille taureau

Catégorie : FAUNE

Famille : *Ranidae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Amérique du Nord - côte Est des États-Unis

Nom anglais : American bullfrog

Auteur : Shaw, 1802

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

En France, plusieurs programmes de gestion sont menés et font l'objet, depuis 2016, d'un programme européen intitulé « [LIFE CROAA](#) » ([Control strategies of invasive alien amphibians](#)) (LIFE15 NAT/FR/000864). Ce programme se donne pour objectif d'améliorer l'état de conservation des populations locales d'amphibiens autochtones, affaiblies par la présence d'espèces exotiques envahissantes d'amphibiens. Parmi ses axes d'action, le programme vise à identifier et appliquer une stratégie optimale de lutte contre les amphibiens exotiques envahissants. Deux espèces présentes en France sont particulièrement ciblées : la Grenouille taureau (*Lithobates catesbeianus*) et le [Xénope lisse](#) (*Xenopus laevis*).

Dans le cadre du LIFE CROAA, plusieurs méthodes de gestion ont pu être expérimentées : piégeage, tir nocturne et diurne, destruction des pontes, barrières de piégeages, pêches et vidanges d'étang. Sur chacun des sites d'intervention, la combinaison de ces méthodes permet d'obtenir des résultats encourageants ([Sarat et al., 2015](#)). De nouvelles techniques de captures sont également menées dans le cadre du programme, afin d'augmenter l'efficacité des actions de lutte. Il s'agit, notamment, de diffuser des chants de Grenouille taureau à proximité des zones colonisées, lors de la période de reproduction, afin d'améliorer la localisation des individus et augmenter le taux de capture. La détection précoce de nouveaux sites colonisés à l'aide des sciences participatives est également mise en œuvre (exemple : lancement de quêtes INPN Espèces sur la Grenouille taureau).

- [Programme pluriannuel 2003-2007 de mise en place d'un plan de gestion de la Grenouille taureau \(*Lithobates catesbeianus*\) en Aquitaine](#)
- [Gestion de la Grenouille taureau \(*Lithobates catesbeianus*\) en Sologne](#)
- [Gestion de la Grenouille taureau dans le Parc naturel régional Périgord-Limousin](#)
- [Gestion de la Grenouille Taureau sur l'île de Vancouver, Canada](#)

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Ramenés volontairement des États-Unis en 1968, une dizaine d'individus ont été placés dans un bassin ornemental en Gironde. L'espèce a également été introduite en Sologne où sa découverte date de 2002. Les plus vieux individus éliminés avaient une dizaine d'années, ce qui impliquerait une introduction de têtards de Grenouille taureau dans les années 1990 (ou alors une introduction plus tardive d'individus déjà métamorphosés). Actuellement, l'espèce occupe le grand Sud-Ouest de la France, ce qui représente la deuxième plus grande aire européenne où la Grenouille taureau est présente ([Sarat, 2012](#)). La Grenouille taureau est très compétitive dès le stade larvaire. Au stade adulte, son régime alimentaire est très large ([Détaint et Coïc, 2003](#)) et comprend notamment des petits amphibiens, des libellules, des serpents ou encore des lézards. Par conséquent, elle menace directement la survie des amphibiens indigènes, par prédation directe et par compétition interspécifique en occupant les mêmes habitats. L'espèce peut coloniser tout type de milieu aquatique, comme les mares, les étangs, les fossés, les bassins de récupération d'eaux de pluie ou encore les cours d'eau à faible courant et les bras morts de rivières. Elle est également susceptible de transmettre aux amphibiens autochtones des pathologies (salmonellose, sparganose, ranavirose), et plus particulièrement la chytridiomycose (transmise par un champignon de la famille des chytrides) dont elle est porteuse saine ([Garner et al., 2006](#)). Or, cette maladie est reconnue comme une cause majeure d'extinction pour les amphibiens ([Berger et al., 1999](#)).

Enfin, la présence de Grenouilles taureau peut également avoir des impacts sur l'activité piscicole de certains étangs. Il est nécessaire de contrôler les poissons pêchés pour éviter le déplacement de têtards de Grenouille taureau en dehors des sites colonisés ([Sarat, 2012](#) et [Sarat et al., 2015](#)).

Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

Contributions : Agnès Merlet, Audrey Trochet et Laurent Barthe (Société Herpétologique de France)

Date de rédaction : 08/06/2021, version 2.

PRODUCT DESCRIPTION

- [Programme pluriannuel 2003-2007 de mise en place d'un plan de gestion de la Grenouille taureau \(*Lithobates catesbeianus*\) en Aquitaine](#)
- [Gestion de la Grenouille taureau \(*Lithobates catesbeianus*\) en Sologne](#)
- [Gestion de la Grenouille taureau dans le Parc naturel régional Périgord-Limousin](#)
- [Gestion de la Grenouille Taureau sur l'Ile de Vancouver, Canada](#)

[ONEMA Nord-Est](#)

[IBMA](#)

[PNR Brenne](#)

[Cellule interdépartementale espèces invasives de Wallonie](#)

[LIFE CROAA](#)

- [Qu'est-ce que le LIFE CROAA ?](#)
- [La Grenouille taureau et le Xénope lisse](#)

[INPN](#)

[GISD](#)

[CABI](#)

[DORIS](#)

- [Berger, L., Speare, R., & Hyatt, A. \(1999\). Chytrid fungi and amphibian declines: overview, implications and future directions. *frogs*, 23.](#)
- [Berroneau, M., Detaint, M., Coïc, C. \(2007\). Premiers résultats du suivi radio télémétrique de la Grenouille taureau en Gironde \(septembre 2004 – juin 2005\). *Bulletin de la Société Herpétologique de France*, 121, 21–33.](#)
- [Berroneau, M., Detaint, M., Coïc, C. \(2008\). Bilan du programme de mise en place d’une stratégie d’éradication de la Grenouille taureau *Lithobates catesbeianus* \(Shaw, 1802\) en Aquitaine \(2003-2007\) et perspectives. *Bulletin de la Société Herpétologique de France*, 127, 35–45.](#)
- [Bramard, M. \(2005\). Test de capture de la Grenouille taureau au moyen de la pêche électrique et de la senne en Sologne \(p. 22\). *Conseil supérieur de la pêche*. Both, C., Lingnau, R., Santos, J. A., Madalozzo, B., Lima, L. P., Grant, T. \(2011\). Widespread Occurrence of the American Bullfrog, *Lithobates catesbeianus* \(Shaw, 1802\) \(Anura: Ranidae\), in Brazil. *South American Journal of Herpetology*, 6, 127–134.](#)
- [CDPNE, & SEBB. \(2010b\). Grenouille taureau *Rana catesbeiana* \(Shaw,1802\) : Bilan des prospections et de la phase opérationnelle 2011 \(p. 34\). CDPNE et SEBB.](#)
- [CDPNE, & SEBB. \(2012\). Grenouille taureau *Rana catesbeiana* \(Shaw,1802\) : Bilan des prospections et de la phase opérationnelle 2012 \(p. 40\). CDPNE et SEBB.](#)
- [Cistude Nature. \(2004\). Protocole d’inventaire de la Grenouille taureau utilisé dans le cadre du programme pluriannuel de mise en place de son éradication dans le sud-ouest de la France. Cistude Nature.](#)
- [Coïc, C., & Détaint, M. \(2001\). Invasion de la Grenouille taureau \(*Rana catesbeiana* Shaw\) en France : Synthèse bibliographique – Suivi 2000-2001 – Perspectives \(p. 30\). Association Cistude Nature.](#)
- [Dejean, T, Valentini, A, Miquel, C, Taberlet, P, Bellemain, E, Miaud, C. \(2012\). Improved detection of an alien invasive species through environmental DNA barcoding: the example of the American bullfrog *Lithobates catesbeianus* : Alien invasive species detection using eDNA. *Journal of Applied Ecology*, 49:953–959.](#)
- [Détaint, M., & Coïc, C. \(2003\). La Grenouille taureau : *Rana catesbeiana* Shaw, 1802. In *Évolution holocène de la faune de Vertébrés de France : invasions et disparitions* \(p. 154-156\). Paris: Institut National de la Recherche Agronomique, Centre National de la Recherche Scientifique, Muséum National d’Histoire Naturelle.](#)
- [Detaint, M., Coïc, C. Etude de la répartition de la Grenouille taureau dans le sud-ouest de la France : données 2003-2004. Poster scientifique. Congrès de la Société Herpétologique de France.](#)
- [Ficetola, G. F., Coïc, C., Detaint, M., Berroneau, M., Lorvelec, O., & Miaud, C. \(2006\). Pattern of distribution of the American bullfrog *Rana catesbeiana* in Europe. *Biological Invasions*, 9\(7\), 767-772. doi:10.1007/s10530-006-9080-y](#)
- [Ficetola, G. F., Thuiller, W., & Miaud, C. \(2007\). Prediction and validation of the potential global distribution of a problematic alien invasive species-the American bullfrog. *Diversity and Distributions*, 13\(4\), 476–485.](#)
- [Ficetola, GF, Maiorano, L, Falcucci, A, Dendoncker, N, Boitani, L, Padoa-Schioppa, E, and others. \(2010\). Knowing the past to predict the future: land-use change and the distribution of invasive bullfrogs. *Global Change Biology*, 16:528–537.](#)
- [Ficetola, GF, Scali, S, Di Tizio, L, Di Cerbo, AR, Di Francesco, N, Cameli, A. \(2010\). Invasive amphibians and reptiles in Italy. In: *Atti VIII Congresso Nazionale Societas Herpetologica Italica*. pp. 335–340.](#)
- [Garner, T. W. ., Perkins, M. W., Govindarajulu, P., Seglie, D., Walker, S., Cunningham, A. A., & Fisher, M. C. \(2006\). The emerging amphibian pathogen *Batrachochytrium dendrobatidis* globally infects introduced populations of the North American bullfrog, *Rana catesbeiana*. *Biology Letters*, 2\(3\), 455.](#)
- [Louette G., Devisscher S., Adriaens T. \(2014\). Combating adult invasive American bullfrog *Lithobates catesbeianus*. *European Journal of Wildlife Research*, 60, 703–706.](#)

[Louette, G, Devisscher, S, Adriaens, T. \(2013\). Control of invasive American bullfrog *Lithobates catesbeianus* in small shallow water bodies. *European Journal of Wildlife Research*, 59:105-114.](#)

[Michelin, G. \(2012\). La grenouille taureau en Sologne, de la lutte à l'éradication. *Sciences Eaux et Territoires*, \(6\), 50-56.](#)

[Michelin, G, Daimé, B, Boilet, S. \(2013\). ADN environnemental. Détection de l'Espèce Exotique Envahissante Grenouille taureau, Sologne. Décembre 2013.](#)

[Parc Naturel Régional Périgord-Limousin. \(2012\). De la lutte contre la Grenouille taureau à la mise au point d'une méthode d'étude de la biodiversité. Restitution d'un travail de recherche conduit dans le cadre d'une thèse de doctorat et d'un programme de coopération financés par la Région Limousin et le FEDER Limousin.](#)

[Orchard, S. A. \(2011\). Removal of the American bullfrog, *Rana \(Lithobates\) catesbeiana*, from a pond and a lake on Vancouver Island, British Columbia, Canada. *Island invasives: eradication and management*. IUCN \(Gland, Switzerland\), 1-542.](#)

[Ouellet, M, Dejean, T, Galois, P. \(2012\). Occurrence of the amphibian chytrid fungus *Batrachochytrium dendrobatidis* in introduced and native species from two regions of France. *Amphibia-Reptilia*, 33:415-422.](#)

[Sarat E. \(coord\). 2012. Les vertébrés exotiques envahissants sur le Bassin de la Loire \(hors poissons\) – Connaissances et expériences de gestion. Office national de la chasse et de la faune sauvage, Plan Loire Grandeur Nature, 128 pp.](#)

[Sarat E., Mazaubert E, Dutartre A., Poulet N., Soubeyran Y. 2015. Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques : connaissances pratiques et expériences de gestion. Volume 2 : expériences de gestion. Onema. Collection comprendre pour agir. 240 pp.](#)

[Adriaens, T., Devisscher, S. & Louette, G. \(2013\). Risk analysis of American bullfrog *Lithobates catesbeianus* \(Shaw\). Risk analysis report of non-native organisms in Belgium. *Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek*. 2013 \(INBO.R.2013.41\). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel](#)

[GB Non-native Species Risk Assessments \(2011\)](#)

[Adriaens, T., Devisscher, S. & Louette, G. \(2013\). Risk analysis of American bullfrog *Lithobates catesbeianus* \(Shaw\). Risk analysis report of non-native organisms in Belgium. *Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek*. 2013 \(INBO.R.2013.41\). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel](#)

Espèce inscrite sur la [liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union Européenne](#), en application du [règlement européen n°1143/2014](#)

Espèce interdite d'introduction dans le milieu naturel par l'[arrêté du 14 février 2018](#) relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain.

Espèce dont la détention est soumise à autorisation :

- [Arrêté du 10 août 2004](#) (en lien avec la CITES) fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques
- [Arrêté du 10 août 2004](#) fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestique

CITATION

OFB & UICN France. 2021. *Lithobates catesbeianus*. Base d'information sur les espèces exotiques envahissantes. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. UICN France et Office français de la biodiversité.

