



NYCTEREUTES PROCYONOIDES

Nom commun : Chien viverrin

Catégorie : FAUNE

Famille : *Canidae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Extrême-Orient - (Chine, Corée, Japon)

Nom Anglais : Raccoon dog

Auteur : Gray, 1834

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Le piégeage du chien viverrin est autorisé toute l'année, et hors de la période de chasse, son tir est soumis à autorisation délivrée par le préfet.

Un programme Life Européen de 3 ans a été lancé en 2010 sur la régulation du chien viverrin en Suède, en Finlande et au Danemark, où les populations sont importantes. Il comprend la mise en place de pièges photographiques, de pose de balises GPS sur des individus, et des campagnes de piégeages et de stérilisation ([Dalh et al. 2013](#)). Les premiers résultats sont positifs, mais les modèles utilisés montrent que la population ne diminuera significativement que si ces actions sont poursuivies sur le long terme.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Importé en Europe de l'est pour les élevages de fourrures entre les années 1930 et 1950, l'espèce s'est ensuite répandue en Europe via des échappées ou des relâchés. En France, des individus sont observés depuis les années 1970 : une enquête de l'ONCFS a rapporté 74 observations entre 1975 et 2005, dont 4 cas de reproduction en nature, et 64 nouvelles données ont été enregistrées entre 2005 et 2013 ([Léger et Ruelle, 2014](#)). La plupart des individus observés dans le nord-est (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) seraient issus des populations allemandes, et les observations sur le reste du territoire seraient issues d'évasions de parcs zoologiques ou de particuliers. Ces observations restent rare en France, et il ne semble pas y avoir d'installation d'un foyer de population, cependant le dynamisme des populations en Allemagne implique une vigilance face l'évolution de la situation.

Le chien viverrin est suspecté d'avoir un impact sur les populations d'amphibiens, notamment sur les îles et les habitats fragmentés ([Kauhala et Auniola, 2001](#)). Il rentre en compétition, directe ou indirecte, avec le Blaireau et le Renard roux ([Kauhala et Auttila, 2010](#) ; [Kauhala et Kowalczyk, 2011](#)). Il est également un vecteur de la rage, de la gale, de la trichinose et d'*Echinococcus multilocularis* (plathelminthe) ([Kauhala et Auniola, 2001](#) ; [Duscher et al., 2017](#)).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Jean-François Maillard, ONCFS.

Date de rédaction : 07/03/2017, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement [Onema Nord-est](#)

[Cellule interdépartementale espèces invasives de Wallonie](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[Baiwy, E., Schockert, V. & Branquart, E. \(2013\) Risk analysis of the raccoon dog *Nyctereutes procyonoides*, Risk analysis report of non-native organisms in Belgium. Cellule interdépartementale sur les Espèces invasives \(CiEi\), DGO3, SPW / Editions, 37 pp.](#)

[Dahl, F., Ahlén P-A., Swartström, J., Lindström, M. and Simmerlsgaard Platz, M-L. 2013. Management of the invasive Raccoon Dog \(*Nyctereutes procyonoides*\) in the north-European countries. LIFE09 NAT/SE/000344](#)

[Duscher, T., Hodžić, A., Glawischnig, W., Duscher, G.G., 2017. The raccoon dog \(*Nyctereutes procyonoides*\) and the raccoon \(*Procyon lotor*\)—their role and impact of maintaining and transmitting zoonotic diseases in Austria, Central Europe. *Parasitol Res* 116, 1411–1416. doi:10.1007/s00436-017-5405-2.](#)

[Kauhala K., Auttila M. 2010. Habitat preferences of the native badger and the invasive raccoon dog in southern Finland. *Acta Theriol.* 55\(3\): 231-240.](#)

[Kauhala K., Kowalczyk R. 2011. Invasion of the raccoon dog *Nyctereutes procyonoides* in Europe: History of colonization, features behind its success, and threats to native fauna—a review. *Current Zoology*, 57\(5\): 584–598.](#)

[Kauhala K. 1996. Introduced carnivores in Europe with special reference to central and northern Europe. *Wildlife biology*, 2\(3\): 197–204.](#)

[Léger F. et Ruetten, S. 2014. Raton laveur et chien viverrin : le point sur leur répartition en France. *Faune Sauvage*. 302 : 9-16](#)

[Léger F., Ruetten S. 2005. Le Chien viverrin en France. *Faune Sauvage*, 269 : 4-13.](#)

[Sarat, E. \(coord\). 2012. Les vertébrés exotiques envahissants sur le bassin de la Loire \(hors poissons\) : connaissances et expériences de gestion. ONCFS, Plan Loire Grandeur Nature, 128 pp. \(p. 70-73\)](#)

[EPPO - Analyse de risque](#)

Espèce inscrite sur la [liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union Européenne](#), en application du [règlement européen n°1143/2014](#)

Espèce sur la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ([arrêté du 26 juin 1987](#)), et visée par [l'arrêté du 28 juin 2016](#) sur les modalités de destruction des espèces non indigènes classées nuisibles.

Espèce interdite d'introduction dans le milieu naturel ([arrêté du 30 juillet 2010](#)), sa détention n'est autorisée qu'au sein d'un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques autorisé ([arrêtés du 10 août 2004](#)).

CITATION

GT IBMA. 2016. *Nyctereutes procyonoides*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

