



PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA

Nom commun : Vigne-vierge à cinq feuilles

Catégorie : FLORE

Famille : Vitaceae

Milieu : Berges des rivières, forêts alluviales

Origine géographique : Amérique

Nom Anglais : Virginia creeper

Auteur : (Linné) Planchon, 1887

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Introduite pour l'ornement, la Vigne vierge à cinq foliole est mentionnée dans le milieu naturel dès 1961, dans le département de la Gironde (SIFlore). Tout comme la Vigne-vierge commune (*Parthenocissus inserta*), la Vigne-vierge à cinq folioles peut former des peuplements denses dans les ripisylves. Son feuillage abondant peut recouvrir les buissons ou les arbres qu'elle prend comme support. Elle peut également couvrir des surfaces importantes au sol, réduisant la diversité floristique et gênant le rajeunissement du sous-bois (Fried, 2012 ; [GB NNSS, 2011](#)).

Répartitions :

En France

En Europe

Contributions : Marianne Hédont et Maxime Guérin, Plante et Cité

Date de rédaction : 25/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela Botanica](#)

[INPN](#)

[CABI](#)

[GB NNS](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Parthenocissus quinquefolia*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

