



TAXODIUM DISTICHUM

Nom commun : Cyprès chauve

Catégorie : FLORE

Famille : *Taxodiaceae*

Milieu : Berges de cours d'eau, marais

Origine géographique : Amérique du Nord

Nom Anglais : Swamp cypress

Auteur : (Linné) Richard, 1801

Introduction en France : métropole et outre-mer

MODALITÉS DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Le Cyprès chauve a été introduit en Europe en 1637, pour l'ornement, par John Tradescant le Jeune au retour de son premier voyage en Virginie.

Pas d'impact documenté actuellement.

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 31/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela Botanica](#)

[CRPF Bretagne](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Taxodium distichum*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

