



Tamias de Sibérie

(*Tamias sibiricus*)

Aussi appelé Écureuil de Corée. Originaire de Sibérie et de l'est de l'Asie (Chine, Corée, Japon). Il a été vendu en Europe comme animal de compagnie depuis les années 1960.

Descriptif

- Petit écureuil d'une centaine de grammes
- Pelage brun-beige, présentant sur le dos cinq raies noires ou brun-foncé, ventre clair
- Pas de dimorphisme sexuel
- Longévité estimée autour de 3 ans en nature, 8 en captivité

Écologie et reproduction dans son milieu d'origine

- Habitats forestiers : forêts de feuillus et/ou de conifères, bois et bosquets, parcs urbains
- Diurne et solitaire
- Trouve abri dans un terrier simple à une entrée, dans lequel il hiberne d'octobre-novembre à février-mars
- Maturité sexuelle à 1 an, gestation de 30 jours ; 1 à 2 portées de 3 à 5 jeunes par an, en avril-mai et juillet-août
- Régime alimentaire : fruits d'arbres (gland, châtaigne, noisette, etc.) à l'automne ; graines d'herbacées, fruits, insectes en printemps/été
- Porteur de bactéries responsables de la borréliose de Lyme

Documentation

- Chapuis J-L. 2005. Répartition en France d'un animal de compagnie naturalisé, le Tamias de Sibérie (*Tamias sibiricus*). Revue d'écologie, 60:239-253.
- Chapuis J-L, Gerriet O, Losinger-Chabod I et Pisanu B. 2018. Gestion d'espèces exotiques envahissantes : le cas des écureuils en France. Faune Sauvage, n°321.
- Chapuis J.L & Pisanu B. 2017. Inventaire national du Patrimoine naturel. Muséum national d'Histoire naturelle [En ligne] https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61204/tab/fiche

Rédaction : Doriane Blottière, Comité français de l'UICN.

Classification

Ordre	Rodentia
Famille	Scuiridae
Genre	<i>Tamias</i>
Espèce	<i>T. sibiricus</i> (Laxmann, 1769)

