



Cadre réglementaire

Identification des espèces prioritaires



Veille et circuit(s) de remontée

## • Poisson-ballon à bandes argentées

- Corps allongé de 20-60 cm (max 85 cm), **sans écailles**, capacité de se gonfler
- Zone dorsale grise argentée/brunâtre parsemée de **tâches noires homogènes (flèches rouges)**, zone ventrale blanche et **bandes latérales argentées (flèche orange)**
- **Spinules** au niveau du ventre et du dos (flèches violettes)
- Dents prononcées et puissantes

3 autres espèces du genre *Lagocephalus* très ressemblantes en Méditerranée

- *L. spadiceus*
- *L. lagocephalus* (native) } Points noirs absents
- *L. suezensis* = points noirs de différentes tailles et répartis de manière hétérogène sur le dos





Cadre réglementaire

## • Poisson-ballon à bandes argentées

Habitat : côtier, fonds sableux, prairies sous-marine, jusqu'à 100m



© L. Reynolds

Identification des espèces prioritaires



- Origine : mer Rouge, océan Indien
- Absent des côtes françaises, présent en Méditerranée (Turquie, Crète, Adriatique Nord...)



- Très grandes populations en Méditerranée = impacts sur les écosystèmes et les réseaux trophiques
- Dégâts sur les filets de pêche, grosses pertes économiques déplorées par les pêcheurs
- Chair contenant une neurotoxine toxique pour l'Homme qui peut être mortelle.



Fiches descriptives disponibles sur le site du centre de ressources

Veille et circuit(s) de remontée