



BERTEROA INCANA

Noms communs : Alysson blanc, Bertéroa blanchâtre

Catégorie : FLORE

Famille : *Brassicaceae*

Milieu : Berges des cours d'eau, bancs de sable et zones sableuses, bords de routes, zones sableuses, décombres, friches, cultures (adventices)

Origine géographique : Europe - Asie

Nom Anglais : Hoary Alison

Auteur : (Linné) De Candolle, 1821

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

En France, les premières mentions de l'espèce remontent au XVIème siècle (SIFlore).

Berteroa incana ne formant pas de peuplements denses interspécifiques, il semble bien s'intégrer aux communautés indigènes et n'est pas cité comme source de nuisance pour les écosystèmes (Fried, 2012). La plante est toxique pour les chevaux ([wikipedia](#)).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Christophe Pineau (CEREMA Ouest)

Date de rédaction : 27/04/2016, version 2

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#)

Espèce inscrite sur la [Liste des organismes nuisibles dont l'introduction est interdite en Nouvelle-Calédonie : Article 1](#)

CITATION

GT IBMA. 2016. *Berteroa incana*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

