



CORDYLOPHORA CASPIA

Nom commun : Cordylophore de la Caspienne

Catégorie : FAUNE

Famille : *Cordylophoridae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Mer Caspienne

Nom Anglais : Freshwater hydroid

Auteur : Pallas, 1771

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

La colonisation de l'Europe par *Cordylophora caspia*, s'est fait via le transport maritime (biofouling). L'espèce est observée en France à partir des années 1970 ([Devin et al. 2005](#)). Sa colonisation est facilitée car elle tolère un grand spectre de salinité ([Folino, 2000](#)).

Elle présente un risque d'encrassement et d'obstruction des installations humaines (systèmes de pompes, grilles d'alimentation, etc.) ([Folino, 2000](#)). Elle entre en compétition avec les espèces locales pour l'habitat et la nourriture et modifie la structure des communautés ([DAISIE, 2017](#)).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 10/04/2017, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement [DORIS](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[Folino N.C. 2000. The freshwater expansion and classification of the colonial hydroid *Cordylophora* \(Phylum Cnidaria, Class Hydrozoa\). *Marine bioinvasions : proceedings of the First National Conference*. 139-144.](#)

[Devin S., Bollache L., Noël P-Y., Beisel J-N. 2005. Patterns of biological invasions in French freshwater systems by non-indigenous macroinvertebrates. *Hydrobiologia*. 551:137-146.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Cordylophora caspia*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

