



## COTULA CORONOPIFOLIA

**Nom commun :** Cotule Pied-de-corbeau

**Catégorie :** FLORE

**Famille :** Asteraceae

**Milieu :** Pelouses humides, bords de marais, lieux vaseux inondables

**Origine géographique :** Afrique du sud

**Nom Anglais :** Brassbuttons

**Auteur :** Linné, 1753

**Introduction en France :** Métropole

### MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.  
L'arrachage manuel des herbiers serait à expérimenter.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Cultivée pour l'ornement de bassins aquatiques, l'espèce est observée dans le milieu naturel en Corse dès 1978. Elle est ensuite observée dans les Pays de la Loire en 1997, en Bretagne en 2007, en Gironde en 2006 puis en Charente en 2010 (FCBN, 2013). En Corse, la Cotule pied-de-corbeau forme des peuplements monospécifiques denses éliminant toute autre espèce sur plusieurs centaines de mètres carrés. Peu de données existent cependant sur son impact en général. En Bretagne, elle semble moins vigoureuse mais reste à surveiller (Fried, 2012).

### Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

**Contributions :** Alain Dutartre (expert indépendant)

**Date de rédaction :** 26/04/2016, version 1

---

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [ORENVA](#)

[FCENINPN](#)

[DAISIE](#)

[EPPO](#) [Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

### CITATION

GT IBMA. 2016. *Cotula coronipifolia*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

