



FALLOPIA BALDSCHUANICA

Nom commun : Renouée de Boukhara

Catégorie: FLORE

Famille : *Polygonaceae*

Milieu : Berges de cours d'eau

Origine géographique : Asie centrale (Chine, Tibet)

Nom Anglais : Russian vine

Auteur : (Regel) Holub, 1971

Introduction en France : métropole

MODALITES DE GESTION

Pas de modalité de gestion connue actuellement.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTES

La Renouée du Turkestan a été introduite pour l'ornement, pour garnir les murs et les palissades. Les premières observations disponibles dans le milieu naturel datent de 1904, dans le département du Puy-de-Dôme. Elle est principalement présente sur la façade méditerranéenne ([SIFlore](#)).

La Renouée du Turkestan forme localement des peuplements denses étouffant la végétation, notamment dans les ripisylves et les arrières-dunes. L'espèce est signalée comme pouvant s'hybrider avec *Reynoutria japonica* (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 09/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion connu actuellement. [Tela Botanica](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[CABI](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Fallopia baldschuanica*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

