



LAGAROSIPHON MAJOR

Noms communs : Lagarosiphon majeur, Grand lagarosiphon

Catégorie : FLORE

Famille : Hydrocharitaceae

Milieu : Eaux stagnantes et à faible courant

Origine géographique : Afrique du Sud - (province du Cap)

Nom Anglais : Curly waterweed

Auteur : (Ridley) Moss

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Des interventions de moisson de *Lagarosiphon major* ont été entreprises dès 1990 sur l'Étang blanc, dans le département des Landes. Ces interventions permettent de couper et de récolter les plantes avec un bateau moissonneur. Les plantes sont coupées le plus près du fond du plan d'eau, à la base des plantes. La moisson est réalisée annuellement, un moisson bisannuelle n'ayant aucun effet sur la production végétale.

En Irlande, des essais d'exclusion de lumière ont été réalisés par pose de toile de jute biodégradable sur le fond du lac, du début de l'été jusqu'à l'automne. Des opérations de coupe mécanique ont également été effectuées sur d'autres zones du site colonisé.

Pour les petites surfaces, l'arrachage manuel par des plongeurs peut être pratiqué. Dans tous les cas, il est indispensable de prendre des mesures de précautions pour éviter la dispersion de fragments (filets, etc.).

- [Interventions de gestion du Grand Lagarosiphon dans l'étang Blanc \(Landes\)](#)
- [Gestion du Grand Lagarosiphon sur le Lac Corrib \(Irlande\)](#)
- [Gestion du Grand Lagarosiphon dans le vallon de Vergnote \(Lot-et-Garonne\)](#)
- [Interventions de gestion du Grand Lagarosiphon dans la retenue du barrage du Salagou \(Hérault\)](#)

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Plante très appréciée en aquariophilie, elle a été rejetée dans le milieu naturel. En France, le Lagarosiphon a été observé pour la première fois dans le milieu naturel dans le Bassin parisien, en 1940.

Capable de créer des herbiers denses sur de très grandes superficies, cette plante peut engendrer une augmentation de la sédimentation dans les plans d'eau. Les modifications physico-chimiques (cycles d'oxygène et de pH) peuvent également être des causes de choc vis-à-vis des populations piscicoles mais peu d'informations sont disponibles sur ce point. L'évolution des herbiers vers la monospécificité conduit dans certains secteurs colonisés à la régression, voire la disparition des espèces hydrophytes indigènes. Cette espèce est aussi source de gêne pour la plupart des loisirs nautiques, ralentissant ou empêchant les déplacements des embarcations, limitant la pratique de la pêche, etc. Enfin, sa capacité à s'étaler à la surface des eaux peut être la cause de modifications esthétiques des milieux ressenties comme des nuisances par les usagers (Dutartre, 2004, in Muller, 2004).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 12/05/2016, version 1 (mise à jour réglementaire et liens 19/02/2021)

PRODUCT DESCRIPTION

[Interventions de gestion du Grand Lagarosiphon dans l'étang Blanc \(Landes\)](#)

[Gestion du Grand Lagarosiphon sur le Lac Corrib \(Irlande\)](#)

[Gestion du Grand Lagarosiphon dans le vallon de Vergnote \(Lot-et-Garonne\)](#)

[Interventions de gestion du Grand Lagarosiphon dans la retenue du barrage du Salagou \(Hérault\)](#)

[Interventions de gestion contre le Lagarosiphon major dans une mare de la RNR « les coteaux du Fel » \(LPO Aveyron\)](#)

[FCEN](#)

[Onema Nord-Est](#)

[IBMA](#)

[CEN LR - Life+ Lag'Nature](#)

[ARPE](#)

[CBN Bailleul](#)

[CPIE Orne](#)

[PNR Brenne](#)

[Cellule interdépartementale espèces invasives de Wallonie](#)

[INPN](#)

[EASIN](#)

[GISD](#)

[CABI](#)

[Bertrin V., Dutartre A., Delest B., Eon M., Fournier A., Jan G., Laplace-Treyture C., Madarassou K., Moreira S., Moirin S., Rosebery J. 2014. Evaluation de l'impact de la moisson de Lagarosiphon major dans l'Etang Blanc \(Landes\). Syndicat mixte Géolandes, Irstea, Région Aquitaine, Agence de l'eau Adour-Garonne. 52pp.](#)

[Dutartre, A., & Oyarzabal, J. \(1993\). Gestion des plantes aquatiques dans les lacs et les étangs landais. Hydroécologie Appliquée, 5, 43-60. <http://doi.org/10.1051/hydro:1993204>](#)

[Caffrey, J.M., Millane, M., Evers, S., Moran, H. and Butler, M. \(2010\). A novel approach to aquatic weed control and habitat restoration using biodegradable jute matting. Aquatic Invasions 5 :123-129.](#)

Caffrey J. 2013. Control of Aquatic species and restoration of natural communities in Ireland (CAISIE). Layman's report. 17 pp.

Caffrey J. 2013. Control of Aquatic species and restoration of natural communities in Ireland (CAISIE). Final report. 69 pp.

Kelly, J., Tosh, D., Dale, K., and Jackson, A. 2013. The economic cost of invasive and non-native species in Ireland and Northern Ireland. Northern Ireland Environment Agency and National Parks and Wildlife Service, Invasive Species Ireland. 95 pp.

[Fournier L., Zuazo A. 2012, Organisation de la gestion des plantes exotiques envahissantes dans les lacs et étangs littoraux landais. Sciences, Eaux et Territoires, 6 : 42-45.](#)

[Lafontaine, R.-M., Beudels-Jamar, R.C., Delsinne, T., Robert, H. 2013. Risk analysis of the Curly Waterweed Lagarosiphon major \(Ridley\) Moss. Risk analysis report of non-native organisms in Belgium from the Royal Belgian Institute of Natural Sciences for the Federal Public Service Health, Food chain safety and Environment. 57 pp.](#)

Dutartre A., Oyarzabal J., Fournier L. 2003. Interventions du Syndicat Mixte Géolandes dans la régulation des plantes aquatiques envahissantes des lacs et des étangs du littoral landais. Gestion des espèces exotiques envahissantes en zones humides, Sallertaine, 13 et 14 novembre 2003. Aestuaria, 6 : 79-97.

Géolandes, 2004. Document de session de formation plantes aquatiques « Présentation des lacs et des étangs landais, de la dynamique de quelques plantes aquatiques indigènes et exotiques et des modalités de gestion des plantes exotiques envahissantes ».

Castagnos E., Dutartre A., 2001. Évolutions récentes des peuplements de plantes aquatiques exotiques dans les lacs et les étangs landais (Landes, France). Cemagref, unité de recherche Qualité des eaux et Géolandes, Étude 66, 227 pp.

Dutartre A., Delarche A. et Dulong J. 1989. Plan de gestion de la végétation aquatique des lacs et étangs landais. Etude CEMAGREF Bordeaux, 38 : 121 pp. [EPPO - Analyse de risque](#) Espèce inscrite sur la [liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union Européenne](#), et devant faire l'objet de mesures de régulation en application du [règlement européen n°1143/2014](#).

Espèce inscrite sur la liste de l'[Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain](#)

CITATION

GT IBMA. 2016. *Lagarosiphon major*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

