



OXALIS PES-CAPRAE

Nom commun : Oxalide pied-de-chèvre

Catégorie : FLORE

Famille : *Oxalidaceae*

Milieu : Grèves exondées des cours d'eau

Origine géographique : Afrique du sud

Nom Anglais : Bermuda buttercup

Auteur : Linné, 1753

Introduction en France : métropole

MODALITÉS DE GESTION

Très peu de modalités de gestion sont connues. Certaines espèces de bétail (dindes et cochons) peuvent manger les bulbes d'*Oxalis pes caprea* (GISD, 2016), mais ces méthodes de gestion restent à expérimenter.

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

L'Oxalis pied-de-chèvre forme souvent des populations monospécifiques sur plusieurs de centaines de mètres carrés. Il peut entraîner une certaine baisse de la richesse spécifique (d'environ 10 % dans les zones envahies). Toutefois sa période de croissance précoce (formation de rosettes à la fin de l'automne et sénescence de la plante au début du printemps) limite les interférences avec la plupart des espèces annuelles méditerranéennes qui pourraient souffrir de sa présence. La plante contient des oxalates et des intoxications du bétail sont signalées dans les régions méditerranéennes où subsiste une activité pastorale (Fried, 2012).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions :

Date de rédaction : 24/05/2016, version 1

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [Tela botanica](#)

[INRA](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[GISD](#)

[CABI](#)

[Fried G. 2012. Guide des plantes invasives. Belin, Paris, 272 pp.](#) Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2016. *Oxalis pes-caprae*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Onema.

