



PECTINATELLA MAGNIFICA

Nom commun : Bryozoaire magnifique

Catégorie : FAUNE

Famille : *Pectinatellidae*

Milieu : Eau douce

Origine géographique : Amérique du Nord

Nom Anglais : Magnificent bryozoan

Auteur : Leidy, 1851

Introduction en France : Métropole

MODALITÉS DE GESTION

Pas de méthode de gestion connue actuellement.

L'enlèvement et la destruction des colonies, parfois préconisés, ne pourraient pas permettre de limiter son abondance d'une année sur l'autre tant la production annuelle de statoblastes est importante ([Notteghem, 2016](#)).

Même si l'espèce est observée dans des étangs oligotrophes (Morvan), ce sont les milieux eutrophes, riches en plancton, qui lui sont les plus favorables. La grande abondance de la pectinatelle est souvent associée à une eau comportant une forte concentration de matière organique avec un développement important d'algues et de cyanobactéries ([Notteghem, 2016](#)). On peut logiquement espérer réduire l'abondance de la pectinatelle d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau en maîtrisant les apports d'azote et de phosphore à l'échelle du bassin versant ou bien, dans les étangs de pisciculture, par une limitation des apports de nutriments et de la densité des poissons, en particulier de la Carpe ([Notteghem, 2016](#)).

MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

Introduite en Europe au XIXe siècle, probablement dans des eaux de ballast, et découverte en 1883 dans la région de Hambourg, elle s'est ensuite étendue en Europe de l'est ([Notteghem, 2009](#)).

En France, elle a été observée pour la première fois en 1994 sur le canal de la Haute-Saône (Territoire de Belfort) ([Notteghem, 2009](#)), puis en 1995 dans l'étang de la Héronnière (Vosges) ([Hondt et Condé, 1996](#)). Depuis ces découvertes, elle a été observée dans de nombreuses régions, notamment en Bretagne (2007), en Corse (2006), en Midi-Pyrénées (2012) ([Notteghem, 2009](#)).

Le développement de *P. magnifica* peut encrasser certaines installations et infrastructures, notamment les stations de traitement des eaux et les centrales électriques (colmatage de filtres, de conduits de pompage, etc.) ([Massard et al., 2013](#)). Ces dommages techniques observés aux USA et en Chine ([Wang et al., 2016](#)), sont encore rares en Europe ([Notteghem, 2016](#)). Cependant des cas de très grande abondance dans des étangs voués à la carpiiculture intensive, avec apport excessif d'aliments (maïs) et densité très importante de carpes, ont été signalés dans l'est de la France. L'abondance était telle qu'après leur décollage automnal les colonies recouvraient la totalité de la surface de certains étangs, ce qui a entraîné des dommages au niveau du déversoir de trop plein de l'un d'eux ([Notteghem, 2009](#)).

Les équipements techniques des grands réservoirs, destinés à la production d'eau potable notamment, sont peu touchés par le développement excessif des colonies de pectinatelle, les prises d'eau étant souvent situées suffisamment en profondeur, au delà de la limite de développement de l'espèce.

La pectinatelle est l'hôte possible du myxozoaire parasite *Tetracapsuloides bryosalmonae*, responsable de la maladie rénale proliférative (MRP) chez les salmonidés, cause de réduction des populations sauvages et de pertes économiques dans les piscicultures ([Massard et al., 2013](#)).

Les oiseaux migrateurs et les activités nautiques contribueraient à sa dispersion ([Notteghem, 2009](#)).

Répartitions :

[En France](#)

[En Europe](#)

Contributions : Patrice Notteghem

Date de rédaction : 28/02/2017, version 1

.
.
.
.
.
.
.

PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement. [DORIS](#)

[Réseau de suivi de la biodiversité aquatique](#)

[INPN](#)

[DAISIE](#)

[IBMA](#)

[Notteghem P., 2009. Evolution de la distribution de la Pectinatelle, *Pectinatella magnifica* \(Leidy, 1851\), Bryzoaire d'eau douce en France et en Europe. *Rev. sci. Bourgogne-Nature*, 9/10 : 188-197.](#)

[Massard J.A., Geimer G. and Wille E. 2013. Appartition de *Pectinatella magnifica* \(Leidy, 1851\) \(Bryozoa, Phylactolaemata\) dans le lac de barrage d'Esch-sur-Sûre \(Luxembourg\).](#)

[Hondt J.-L. d' & B. Condé, 1996. Une espèce de Bryozoaire d'eau douce \(Phylactolaemates\) nouvelle pour la faune française : *Pectinatella magnifica* \(Leidy, 1851\). *Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon*, 65\(10\) : 322-326.](#)

[Balounova, Z., E. Pechouskova, J. Rajchard, V. Joza & J. Sinko, 2013. World-wide distribution of the Bryozoan *Pectinatella magnifica* \(Leidy, 1851\). *Europ. Jour. Environnemental Sci.*, 1, 3 : 96-100.](#)

[Chabrol L. 2016. Nouvelles observations de *Pectinatella magnifica* \(Leidy, 1851\) \(Bryozoaire\) en Limousin. *Bull. Soc. Linn. Bordeaux*, Tome 151, nouv. série N°44 \(4\): 437-440.](#)

[Massard J.-A. & G. Geimer, 2008. Global diversity of bryozoans \(*Bryozoa* or *Ectoprocta*\) in freshwater : an update. *Bull. Soc. Nat.Luxemb.*,109 : 139-148.](#)

Notteghem P., 2016. La Sisyre noire (*Sisyra nigra*), Névroptère autochtone, parasite de la Pectinatelle (*Pectinatella magnifica*), Bryozoaire allochtone. *Rev. sci. Bourgogne-Nature*, 23 : 139-146.

[Notteghem P. 2016. La Pectinatelle, un Bryozoaire dulçaquicole aujourd'hui largement répandu et parfois très encombrant. Lettre d'information du GT IBMA n°16. Agence française pour la biodiversité et UICN France.](#)

[Rodriguez S. & J.-P. Vergon, 2002. *Pectinatella magnifica* Leidy 1851 \(Phylactolaemates\), un Bryozoaire introduit dans le nord de la Franche-Comté. *Bull. Fr. Pêche Piscic.*, 365-366 : 281-296.](#)

[Wang B., H. Wang & Y. Cui, 2016. *Pectinatella magnifica* \(Leidy, 1851\) \(*Bryozoa*, *Phylactolaemata*\), a biofouling bryozoan recently introduced to China. *Chinese J. Oceano. Limno.*](#)

Espèce non réglementée.

CITATION

GT IBMA. 2017. *Pectinatella magnifica*. Base d'information sur les invasions biologiques en milieux aquatiques. Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques. UICN France et Agence française pour la biodiversité.

