



## STYELA CLAVA

**Noms communs :** **Ascidie plissée**

**Catégorie :** **FAUNE**

**Famille :** **Styelidae**

**Milieu :** **Rochers et infrastructures artificielles des zones côtières assez abritées**

**Origine géographique :** **Pacifique Nord-Ouest (Japon et Russie)**

**Nom anglais :** **Asian tunicate**

**Auteur :** **Herdman, 1881**

**Introduction en France :** **Métropole**

### MODALITÉS DE GESTION

L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion particulières.

### MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS

En France, la première population isolée de *S. clava* a été observée 1963 à Dieppe (Seine-Maritime) (Monniot, 1970). En 1968, elle est observée pour la première fois au Havre (Seine-Maritime) (Coughlan, 1969 ; Breton et Dupont, 1978).

Aujourd'hui, cette ascidie est présente dans toutes les eaux marines tempérées incluant les côtes ouest et est des États-Unis, le Royaume Uni, l'Europe, l'Asie et l'Australie.

C'est un organisme « fouling » qui colonise les ancres, les coques des navires, les équipements de pêche ainsi que les autres infrastructures artificielles humaines. Au Canada, *S. clava* cause des pertes de production de moules en colonisant de manière dense les cordes de cultures. Bien que cette ascidie soit aussi présente sur les cordes de culture d'huîtres de l'étang de Thau (Occitanie), celle-ci ne semble pas représenter une menace sérieuse (Davis *et al.*, 2007). Au Japon, l'espèce entraînerait l'apparition d'asthme chez les travailleurs qui ouvrent les huîtres, car ces derniers inhaleraient des particules fines de *S. clava* (Morris *et al.*, 1980).

### Répartitions :

[En France](#)

[Dans le monde](#)

**Contributions :** **Cette fiche a été réalisée en collaboration avec l'UMS PatriNat dans le cadre de la Directive-cadre Stratégie pour le milieu marin** - Anne Lizé, relecture par Cécile Massé (UMS PatriNat)

**Date de rédaction :** 18/03/2021, version 1

## PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement [DORIS](#)

[BioObs](#)

[INPN](#)

[CABI](#)

[GISD](#)

[WoRMS](#)

[Nemesis](#)

Gouletquer P. 2016. *Guide des organismes exotiques marins*. Belin. p. 303.

Bachelet G., Cazaux C., Gantes H., Labourg P.J. 1980. Contribution a l'étude de la faune marine de la région d'Arcachon. *Bulletin du Centre d'Etude et de Recherche Scientifique de Biarritz* 13: 45-64.

Breton G., Dupont W. 1978. *Styela clava* Herdman, ascidia nouvelle pour les côtes de la baie de Seine, abondé dans le port du Havre. *Bulletin Trimestriel de la Société Géologique de Normandie et des Amis du Muséum du Havre* 65: 51.

Coughlan J. 1969. The leathery sea squirt - a new ascidian from Milford Haven. *Nature in Wales* 11: 192-193.

Davis M.H., Davis M.E. 2008. First record of *Styela clava* (Tunicata, Ascidiacea) in the Mediterranean region. *Aquatic Invasions* 3: 125-132.

Davis M.H., Lützen J., Davis M.E. 2007. The spread of *Styela clava* Herdman, 1882 (Tunicata, Ascidiacea) in European waters. *Aquatic Invasions* 2: 378-390.

Davout D., Dewarumez J.-M., Glacon R. 1993. Nouvelles signalisations d'espèces macrobenthiques sur les côtes françaises de la Manche orientale et de la Mer du Nord. IV. Groupes divers. *Cahiers de Biologie Marine* 34: 55- 64.

Monniot C. 1970. Sur quatre ascidies rares ou mal connues des côtes de la Manche. *Cahiers de Biologie Marine* 11: 145-152.

Morris R.H., Abbott D.P., Haderlie E.C. 1980. *Intertidal Invertebrates of California*. Stanford, California, Stanford University Press, pp. 690.

Espèce non réglementée.

**CITATION**

OFB & UICN France. 2021. *Styela clava*. Base d'information sur les espèces exotiques envahissantes. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes. UICN France et Office français de la biodiversité.

