

LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

RECONNAÎTRE
AGIR
SURVEILLER

MORBIHAN SUD - ÉDITION 2026



Parc
naturel
régional
du Golfe
du Morbihan
Park ar Mor Bihan



SYNDICAT MIXTE
RIA D'ETEL



FREDON
BRETAGNE



LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES COMMENCE DANS NOS JARDINS !



Beaucoup des plantes exotiques envahissantes qui colonisent les paysages bretons sont des plantes horticoles qui se sont "**échappées de nos jardins**".

LEURS MODES DE COLONISATION

REPRODUCTION NATURELLE AUTOUR DE LA PLANTE MÈRE :


PAR GRAINE



À PARTIR DES RACINES OU
DES TIGES



Drageonnement



Marcottage

TRANSPORT VERS DES ZONES ÉLOIGNÉES :

Les graines et morceaux de végétaux sont transportés naturellement par :

LE VENT



LES ANIMAUX



L'EAU



Les déplacements et plantations des humains amplifient la dispersion des plantes à des échelles très larges.



COMMENT AGIR ?

- 1 J'identifie l'espèce
- 2 J'interviens à la bonne saison et je prévois la gestion des résidus de coupe
- 3 Je nettoie mes outils après intervention
- 4 Dans mon jardin, je remplace par des espèces locales non envahissantes et, en espace naturel, je laisse la végétation locale s'installer naturellement
- 5 Je surveille les éventuelles repousses

HORS PÉRIODE DE FLORAISON ET FRUCTIFICATION POUR ÉVITER TOUTE DISSÉMINATION.





EXOTIQUE ENVAHISSANTE ?

Une plante exotique envahissante est une espèce végétale introduite par l'humain, volontairement ou de façon accidentelle.

Une fois acclimatée, elle prolifère abondamment altérant l'équilibre des écosystèmes et pouvant affecter les activités humaines.



ELLES IMPACTENT :

● LA FAUNE ET LA FLORE LOCALES

Les espèces exotiques envahissantes entrent en compétition avec les espèces locales, pour l'espace, la lumière, l'alimentation... et peuvent les évincer.

● LES PAYSAGES

Elles menacent l'identité de notre territoire morbihannais en modifiant nos paysages.

● LA SANTÉ

Certaines sont toxiques, voire mortelles, à l'ingestion et peuvent générer des allergies (pollens) ou brûlures chez les humains et autres mammifères.

● L'ÉCONOMIE

Les espèces exotiques envahissantes peuvent nuire aux activités économiques (pertes agricoles, conséquences sur le tourisme, dégradation d'infrastructures, coûts de gestion...).



◀ L'HERBE DE LA PAMPA TOTALITAIRE : ELLE A PRIS LA PLACE DE NOMBREUSES AUTRES ESPÈCES.

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

GRIFFE DE SORCIÈRE



FRUIT EN FORMATION

FEUILLE GRASSE CHÂRNUE



FLEUR ROSE
OU BLANCHE



© Eva Burguin (CBNB)



PLANTE REMPANTE,
FORMANT DES "TAPIS"

© Marion Hardegen (CBNB)

NE PAS PLANTER

GRIFFE DE SORCIÈRE

Carpobrotus edulis

Carpobrotus acinaciformis



Origine : Afrique du Sud

Hauteur : 15 cm

Floraison : Rose ou blanche

Mode de dissémination : par reprise depuis des fragments de tiges ou de racines et dispersion des graines par les animaux

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PÉRIODE DE FLORAISON
ET FRUCTIFICATION

BON À SAVOIR :

- Plante grasse produisant 1000 à 2000 graines par pied
- Longues tiges rampantes qui s'enracinent à leur extrémité formant de nouveaux individus
- Libération de substances chimiques par les feuilles en décomposition impactant la fertilité des sols

COMMENT AGIR ?




Arracher manuellement l'ensemble des plants (tiges et racines) en prenant soin de ne laisser aucun résidu dans ni sur le sol.

L'enracinement étant relativement superficiel, l'arrachage se fait facilement et donne rapidement des résultats.

Période d'intervention : fin d'hiver, début de printemps

PAR QUOI LA REMPLACER ?



Thym serpolet
Thymus serpyllum



Phlox
Phlox subulata

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

BACCHARIS

FLEURS MÂLES
JAUNÂTRES

FLEURS FEMELLES
BLANCHES

© Daniel Lasne



FEUILLE DENTELÉE



© Jean-Jacques Milan

BACCHARIS ENVAHISSANT
(COULEUR VERT VIF)



NE PAS PLANTER

BACCHARIS

Baccharis halimifolia




Origine : Amérique du Nord

Hauteur : 4 à 5 m

Floraison : blanche

Mode de dissémination :

dispersion des graines par le vent



PÉRIODE DE FLORAISON
ET FRUCTIFICATION

BON À SAVOIR :

- Jusqu'à 1 million de graines produit pour un arbuste de 2 m de haut
- Stock important de graines dans le sol au pied du plant
- Lutte contre le baccharis renforcée dans le Morbihan par un arrêté préfectoral

COMMENT AGIR ?



Petit sujet (< 80 cm de haut) : arracher manuellement

Sujet moyen (80 cm à 1,5 m) : couper le pied à 50 cm de haut et arracher les racines à la pioche ou bêche


Gros sujet : couper et dévitaliser au gros sel avec 100 g/pied en une application sur 1-2 cm d'épaisseur.

Période d'intervention : décembre à mars

PAR QUOI LA REMPLACER ?



Sureau noir
Sambucus nigra



Aubépine
Crataegus monogyna

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

HERBE DE LA PAMPA



© Emilie Mazaubert

FORME UNE
GRANDE TOUFFE



© Gilles Grisard

FLEUR EN
PLUMEAU



FEUILLES LONGUES, FINES
ET COUPANTES



© Dunes Sauvages de Gâvres à Quiberon

NE PAS PLANTER

HERBE DE LA PAMPA

Cortaderia selloana



Origine : Amérique du Sud

Hauteur : 3 m

Floraison : plumeau beige

Mode de dissémination :
dispersion des graines par le vent
et les activités humaines

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

← PÉRIODE DE FLORAISON
ET FRUCTIFICATION

BON À SAVOIR :

- 1 pied produit plusieurs millions de graines dispersées jusqu'à 25 km à la ronde
- Risque allergique au pollen fort

COMMENT AGIR ?



A minima, couper les plumeaux dès leur apparition. Les mettre en sac hermétique ou les laisser se décomposer au pied du plant.

Petit sujet (< 50 cm de diamètre) : arracher les racines à l'aide d'une pioche/bêche après avoir coupé les feuilles pour en faciliter l'accès.

Gros sujets (> 50 cm de diamètre) : arracher à la minipelle ou couper les feuilles puis rogner les racines, avec par exemple une débroussailleuse à lame. Les racines rognées sont à bâcher 2 à 3 ans - à défaut, répéter le rognage.

SE MUNIR D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION (GANTS, LUNETTES, ETC.)
POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE AVEC LES FEUILLES !

Période d'intervention : décembre à août (sauf si coupe et mise en sac des plumeaux avant intervention)

PAR QUOI LA REMPLACER ?



Canche cespiteuse
Deschampsia caespitosa



Laîche orange
Carex testacea

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

CINÉRAIRE MARITIME

FLEURS JAUNES
EN CORYMBE



FEUILLE GRISÂTRE
DÉCOUPÉE



NE PAS PLANTER

CINÉRAIRE MARITIME

Jacobaea maritima




Origine : Pourtour méditerranéen

Hauteur : 0,5 m

Floraison : Corymbes jaunes

Mode de dissémination :

dispersion des graines par le vent



← PÉRIODE DE FLORAISON
ET FRUCTIFICATION

BON À SAVOIR :

- Buissons grisâtres formant un couvert très dense
- Feuilles lobées avec des échancrures profondes et couvertes d'un duvet très fin
- Adaptée aux sols salins et exposés au vent

COMMENT AGIR ?



Arracher manuellement en prenant soin de ne laisser aucun résidu de la plante dans ni sur le sol.

L'enracinement étant relativement superficiel, l'arrachage se fait facilement et donne rapidement des résultats.

Période d'intervention : Décembre à avril

PAR QUOI LA REMPLACER ?



Santoline petit-cyprès
Santolina chamaecyparissus




Œillet des Sables
Dianthus arenarius

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

YUCCA

FÉUILLES POINTUES
ET COUPANTES



RHIZOMES



FLEUR BLANCHE
EN CLOCHETTE



YUCCA ENVAHISSANT UN
MILIEU DUNAIRE



NE PAS PLANTER

YUCCA

Yucca gloriosa




Origine : Amérique du Nord

Hauteur : 1 m

Floraison : hampe florale composée de fleurs blanches

Mode de dissémination : drageonnement des racines et bouturage



PÉRIODE DE FLORAISON
ET FRUCTIFICATION

BON À SAVOIR :

- Système racinaire profond avec des gros rhizomes
- Reprise forte et rapide à partir des racines
- Feuilles coupantes à extrémité piquante

COMMENT AGIR ?




Arracher à la pioche/bêche les petits sujets ou mécaniquement pour les plus gros en enlevant le système racinaire. Pour un meilleur résultat, creuser afin d'enlever le maximum de rhizomes.

SE MUNIR D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION (GANTS, LUNETTES, ETC.) POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE !

Période d'intervention : mars à août

PAR QUOI LA REMPLACER ?



Diosmée
Diosma hirsuta



Chardon boule
Echinops ritro

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

BALSAMINE DE BALFOUR



NE PAS PLANTER

BALSAMINE DE BALFOUR

Impatiens balfourii




Origine : Est de l'Asie et Himalaya

Hauteur : 30 à 120 cm de haut

Floraison : juin à septembre

Mode de dissémination : Ses fruits explosent à maturité au moindre contact et éjectent les graines à plusieurs dizaines de centimètres.



← PÉRIODE DE FLORAISON
ET FRUCTIFICATION

BON À SAVOIR :

- Propagation par voie d'eau
- Racines peu développées, se cassant et s'arrachant facilement
- Pâturage régulier possible

COMMENT AGIR ?



Arrachage manuel avant floraison.

Si l'arrachage s'effectue en proximité d'un cours d'eau, prendre des mesures pour éviter la dispersion des graines.

Si le foyer s'étend sur une grande surface :


- 1• fauche en entrée de saison
- 2• fauche en cours de saison

Période d'intervention : juin à octobre

PAR QUOI LA REMPLACER ?




Fleur des elfes
Epimedium grandiflorum



Lis des cafres
Schizostylis coccinea 'Mrs Hegarty'

ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

ARBRE À PAPILLON



NE PAS PLANTER

ARBRE À PAPILLON

Buddleja davidii



Origine : Chine et Tibet

Hauteur : 2 à 5 mètres

Floraison : inflorescences en épi
violette à blanches

Mode de dissémination : dispersion des
graines (vent, eau, activités humaines), et de manière
végétative par reprise depuis des fragments de tiges ou
de racines.



PÉRIODE DE FLORAISON
ET FRUCTIFICATION

BON À SAVOIR :

- Les individus sont matures dès la première année
- Importante banque de graines dans le sol

COMMENT AGIR ?



Pour les petits sujets : arrachage à la pioche ou à la bêche.

Pour les gros sujets : arrachage mécanique (coupe préalable des pieds puis dessouchage) ou coupe rase et perçage à la perceuse pour favoriser dégradation de la souche.

Période d'intervention : printemps (avant fructification)

PAR QUOI LA REMPLACER ?



Spirée bleue
Caryopteris x clandonensis



Sureau noir
Sambucus nigra

LES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DES HAIES

NE PAS PLANTER



COTONÉASTERS

Cotoneaster franchetii Bois, *Cotoneaster horizontalis* Decne., *Cotoneaster symondsii* Standish, *Cotoneaster x watereri* Exell

Hauteur : de couvre-sol à 3m

Floraison : blanche à rosée

Mode de dissémination : graines, drageonnement des racines

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



PYRACANTHA


Pyracantha sp.

Hauteur : 6 m

Floraison : blanche à rosée

Mode de dissémination : graines

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



LAURIERS PALME ET SAUCE

Prunus laurocerasus, *Laurus nobilis*

Hauteur : 4 m

Floraison : blanche

Mode de dissémination : graines, drageonnement des racines

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



ELAEAGNUS - CHALEF D'EBBING


Elaeagnus x submacrophylla Servett

Hauteur : 3 m

Floraison : blanche

Mode de dissémination : graines, drageonnement des racines

FLORAISON ET FRUCTIFICATION



LES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DES HAIES

COMMENT AGIR ?



Petits individus et rejets : arracher manuellement y compris des racines.


Gros plants : arracher mécaniquement ou couper à ras et percer la souche pour favoriser le pourrissement par l'eau.

Période d'intervention : hors période de fructification et de nidification des oiseaux (15 mars au 31 juillet).


PAR QUOI LES REMPLACER ?




Aubépine monogyne
Crataegus monogyna



Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea



Néflier
Mespilus germanica



Genêt à balais
Cytisus scoparius



Noisetier
Corylus avellana



Viorne obier
Viburnum opulus

EXOTIQUES ENVAHISSANTES À ENJEU SANTÉ

Attention certaines plantes peuvent porter atteinte à votre santé ou à celle de votre entourage !



AMBROISIE À FEUILLES D'ARMOISE

Ambrosia artemisiifolia

Hauteur maximale : 1,5 m

Floraison : épis verts d'août à septembre

Mode de dissémination : graines

POLLEN TRÈS ALLERGISANT

→ **Arracher avant la floraison avec des gants**



RAISIN D'AMÉRIQUE

Phytolacca americana

Hauteur maximale : 2,5 m

Fructification : d'août à septembre - octobre

Mode de dissémination : graines

PLANTE ET BAIES TRÈS TOXIQUES

→ **Arracher en juin-juillet avec des gants à l'aide d'une bêche**



DATURA STRAMOINE

Datura stramonium

Hauteur maximale : 1,5 m

Floraison : août-septembre

Mode de dissémination : graines

PLANTE ET BAIES TRÈS TOXIQUES

→ **Arracher avec des gants avant la production de graines**

LES EXOTIQUES ENVAHISSANTES "ALERTE"

La lutte contre les espèces ci-dessous est fortement déconseillée aux particuliers. Si vous en identifiez, signalez leur présence !

NE PAS AGIR



Reynoutria japonica

RENOUÉES

Reynoutria japonica
Reynoutria x bohemica
Reynoutria sachalinensis
Koenigia polystachya

Hauteur : 3 mètres

Floraison : estivale

Mode de dissémination : marcottage
des tiges - drageonnement des racines

GESTION DIFFICILE - RISQUE TRÈS
IMPORTANT DE DISPERSION



BERCE DU CAUCASE

Heracleum mantegazzianum

Hauteur : 4 m

Floraison : fin juin - début juillet

Mode de dissémination : graines



Confusion possible avec
des ombellifères locales

ENJEU SANITAIRE -
GRAVE BRÛLURE



ALERTE
ESPÈCES

Une des **espèces à enjeux de santé** sur
votre terrain? Signalez-là avec votre
smartphone !

Outil mis en place par FREDON Bretagne
avec le soutien de l'ARS.



APRÈS L'ARRACHAGE OU LA COUPE, QUE FAIRE ?

1 GESTION DES RÉSIDUS DE VÉGÉTAUX

Privilégier la gestion des **résidus sur le terrain d'intervention.**

- Limite la dispersion des plantes
- Evite les coûts de transport
- Réduit les déchets verts en déchèterie.

LES SOLUTIONS DE GESTION SUR VOTRE TERRAIN :



ARBRES & ARBUSTES

VALABLE POUR
YUCCA & PAMPA



Laisser décomposer
en tas ou haie sèche
(sans contact entre
racines arrachées et
le sol)

OU



Broyer/déchiqeter
puis déposer le
broyat sur les zones
traitées ou en
paillage



AUTRES
VÉGÉTAUX

Composter après avoir laissé sécher sur une
surface imperméable (bâche, surface
bétonnée, bac, grand sac ...).

APPORT EN DÉCHÈTERIE

=

**DERNIER RECOURS POUR LES
VÉGÉTAUX SANS GRAINES !**

→ AVEC REMORQUE BÂCHÉE OU VÉHICULE FERMÉ



*Les dépôts sauvages
sont interdits et
sanctionnables.*


2 SURVEILLANCE DE LA ZONE TRAITÉE

Les années suivantes,
une germination des
graines présentes
dans le sol ou une
reprise du plant
(racines, tiges...) peuvent s'observer.



AVANT

ARRACHER LES
REPOUSSES



ANNEES SUIVANTES...

Dans ce guide vous sont présentées **les principales plantes exotiques envahissantes « échappées de nos jardins » qui posent actuellement problème dans le Sud Morbihan**. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres espèces peuvent localement poser souci.

POUR EN SAVOIR PLUS

SUR LES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

LISTE COMPLÈTE DES
ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES EN
BRETAGNE :



- cbnbrest.fr
- fredon-bretagne.com
- especes-exotiques-envahissantes.fr

SUR LES PLANTES DE REMPLACEMENT :

GUIDE "QUELS
VÉGÉTAUX planter" :



gavres-quiberon.fr



Ce guide a été créé par le groupe de travail sur les espèces exotiques envahissantes rassemblant des collectivités du sud Morbihan, ainsi que la Fredon Bretagne.

PARTENAIRES :



COFINANCÉ PAR
UNION EUROPÉENNE



L'Europe s'engage
en Bretagne



